

DEVENIR



Contains pymetrozine, the active ingredient used in Endeavor®.

Para el control de las plagas de insectos indicadas en plantas ornamentales de paisajismo y jardines interiores, plantas ornamentales cultivadas en el campo y en contenedores, árboles de Navidad y árboles frutales y de frutos secos no productivos cultivados en invernaderos, viveros, casetas de listones y umbráculos.

Para el control de las plagas de insectos indicadas en hortalizas cultivadas para su venta a los consumidores y producidas en invernaderos, viveros, casetas de listones y umbráculos.

Ingrediente activo:	(% por peso)
Pimetrozina N.º CAS 123312-89-0	50.0%
Otros ingredientes:	50.0%
Total	100.0%
Devenir está formulado como gránulos dispersables en agua.	
N.º de reg. de EPA: 91234-97	

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS CAUTION/PRECAUCIÓN

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Vea las declaraciones de precaución adicionales más abajo

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel o la ropa:	- Quítese la ropa contaminada. - Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. - Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos:	- Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. - Si utiliza lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. - Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento.
Si es inhalado:	- Traslade a la persona a un lugar con aire fresco. - Si la persona no está respirando, llame al 911, a su número local de emergencia o a una ambulancia, luego dé respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. - Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento.
Si se ingiere:	- Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para pedir consejo de tratamiento. - Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. - No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. - No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar a SafetyCall al 1-844-685-9173 para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.

En caso de emergencia química: En caso de derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC, de día o de noche, dentro de los EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 o +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)

Devenir no es fabricado ni distribuido por Syngenta Crop Protection, LLC, vendedor de Endeavor®.



Fabricado para:
Atticus, LLC
940 NW Cary Parkway, Suite 200
Cary, NC 27513, EE. UU.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Dañino si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular los pesticidas y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los aplicadores y otros manipuladores de pesticidas deben usar:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). Si no hay instrucciones para las prendas lavables, lávelas con detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

Controles de ingeniería

Cuando los manipuladores del producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de una manera que se cumpla con los requisitos establecidos en el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240 (d) (4-6)], los requisitos en cuanto al PPE de estas personas pueden reducirse o modificarse según lo especificado en el WPS.

Recomendaciones de seguridad para el usuario

Los usuarios deben:

- Quitarse inmediatamente la ropa/PPE si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el PPE luego de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse muy bien y cambiarse de ropa lo antes posible.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

No lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. No contamine el agua cuando limpie el equipo ni al deshacerse del agua utilizada para lavarlo.

RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

No lo use, vierta, derrame ni almacene cerca de una fuente de calor o de una llama expuesta.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la ley federal (EE. UU.) utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta.

RESTRICCIONES DE USO PARA TODOS LOS CULTIVOS

- No aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Sólo se permite la presencia de los manipuladores del producto con protección adecuada en el área durante su aplicación. Para obtener información acerca de los requisitos específicos para su estado o tribu, consulte a la agencia estatal o tribal responsable de la regulación de pesticidas.
- No aplique este producto de forma aérea.
- No aplique más de 10 oz de producto (0.31 lb de i.a.) por acre y por aplicación.
- Para uso en exteriores, no aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año.
- Para uso en interiores, no aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año.
- Para usar en California, no aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año.
- **PARA PLANTAS CULTIVADAS EN CONTENEDORES:**
 - No aplique a menos de 900 pies (274 m) de cualquier pozo donde la profundidad hasta el agua subterránea sea menor de 30 pies (9 m); 0

- Si la profundidad del agua subterránea es menor de 30 pies (9 m), se requiere un sistema de manejo de la escorrentía y la lixiviación.

PARA PLANTAS CULTIVADAS EN EL SUELO:

- No aplique pimetozina si:
 - El suelo contiene más de 60% de arena Y
 - El suelo contiene menos de 3% de materia orgánica Y
 - La profundidad hasta el agua subterránea es menor de 30 pies (9 m)

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE ESTA ETIQUETA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS CULTIVOS Y/O UN CONTROL DEFICIENTE DE LOS INSECTOS.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Utilice este producto únicamente de acuerdo con su etiqueta y con el Estándar para la Protección del Trabajador, 40 CFR Parte 170. Dicho estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene requisitos para la capacitación, descontaminación, notificación y asistencia de emergencia. También contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal (PPE) y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos en esta sección de la etiqueta corresponden únicamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS).

No ingrese ni permita la entrada de trabajadores a las áreas tratadas durante el intervalo de acceso restringido (REI, por sus siglas en inglés) de 12 horas.

El PPE requerido para el acceso anticipado a áreas tratadas de acuerdo con el Estándar para la Protección del Trabajador, y que involucra el contacto con cualquier elemento que se haya tratado, como plantas, tierra o agua, consiste en:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en esta sección de la etiqueta corresponden a los usos de este producto que NO están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR Parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar rige cuando este producto se utiliza para cultivar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

No ingrese a las áreas tratadas sin ropa protectora hasta que se haya secado la aspersión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Devenir es un insecticida que controla áfidos y moscas blancas en plantas ornamentales de paisajismo, plantas ornamentales cultivadas en el campo, plantas ornamentales cultivadas en contenedores, árboles frutales y de frutos secos no productivos en viveros, árboles de Navidad, cubiertas vegetales y plantas ornamentales en invernaderos, casetas de listones, umbráculos y jardines interiores, así como hortalizas cultivadas para la venta a consumidores y producidas en invernaderos, viveros, casetas de listones y umbráculos.

MODO DE ACCIÓN: **Devenir** tiene un modo de acción que controla los áfidos y las moscas blancas al detener su actividad alimentaria. Estos insectos cesan su alimentación dentro de algunas horas después de la aplicación, pero permanecen en la planta por un tiempo breve (de 2 a 4 días). **Devenir** tiene actividad residual en la planta y controlará los áfidos y las moscas blancas que se desplacen hacia la planta después de la aspersión.

SEGURIDAD DE LAS PLANTAS: Se ha evaluado la fitotoxicidad de **Devenir** en muchas plantas de invernadero, de vivero y ornamentales. Ninguna planta sometida a prueba bajo condiciones de investigación universitaria y de producción comercial ha evidenciado fitotoxicidad en las tasas indicadas en la etiqueta de **Devenir**. Aunque se han sometido a prueba muchas especies y cultivares, debe evaluarse la fitotoxicidad de un pequeño grupo de cada especie y cultivar dos semanas antes de realizar las aplicaciones a todo el cultivo. No deben hacerse aplicaciones foliares en nochebuenas después del desarrollo de las brácteas.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

Para el manejo de la resistencia, **Devenir** contiene un insecticida del Grupo 9. Cualquier población de insectos puede contener individuos naturalmente resistentes a **Devenir** y a otros insecticidas del Grupo 9. Los individuos resistentes pueden dominar la población de insectos si este grupo de insecticidas se usa repetidamente en los mismos campos. Se deben seguir estrategias apropiadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia a los insecticidas, siga estos pasos:

- Alterne la aplicación de **Devenir** o de otros insecticidas del Grupo 9 dentro de una temporada de cultivo, o entre temporadas de cultivo, con insecticidas de diferentes grupos que controlan las mismas plagas.
- Use mezclas en tanque con insecticidas de un grupo diferente que sean igualmente eficaces en la plaga objetivo cuando se permita dicho uso. No confíe en la misma mezcla repetidamente para la misma población de plagas. Tenga en cuenta todos los problemas conocidos de resistencia cruzada (para las plagas objetivo) entre los componentes individuales de una mezcla. Además, considere las siguientes recomendaciones proporcionadas por el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas (IRAC, por sus siglas en inglés):
 - Los insecticidas individuales seleccionados para su uso en mezclas deben ser altamente eficaces y aplicarse en las tasas a las que se registran individualmente para su uso contra las especies objetivo.
 - No se recomiendan las mezclas con componentes que tengan la misma clasificación de modo de acción del IRAC para el manejo de la resistencia de los insectos.
 - Al usar mezclas, tenga en cuenta todo problema conocido de resistencia cruzada entre los componentes individuales para la(s) plaga(s) objetivo.
 - Las mezclas se vuelven menos eficaces si ya se está desarrollando resistencia a uno de los ingredientes activos o ambos, pero igualmente pueden brindar beneficios para el manejo de las plagas.
 - Los beneficios del manejo de la resistencia de los insectos de una mezcla de insecticidas son mayores si los dos componentes tienen períodos similares de actividad insecticida residual. Las mezclas de insecticidas con períodos desiguales de actividad insecticida residual pueden ofrecer un beneficio de manejo de la resistencia de los insectos sólo durante el período en el que ambos insecticidas están activos.
- Adopte un programa de manejo integrado de plagas para el uso de insecticidas que incluya exploración, que aplique información histórica relacionada con el uso de pesticidas, la rotación de cultivos, el mantenimiento de registros y que considere prácticas de cultivo, biológicas y otras prácticas de control químico.
- Monitoree el área tras la aplicación para detectar la supervivencia imprevista de plagas objetivo. Si el nivel de supervivencia sugiere una posible resistencia, consulte con su especialista agrícola de una universidad local o con un asesor certificado en control de plagas.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local o asesores certificados en cultivos para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de la resistencia a los pesticidas y/o el manejo integrado de plagas para el sitio específico y los problemas de plagas en su área.

Para obtener información o para reportar una presunta resistencia, llame a Atticus, LLC al (984) 465-4800.

ADECUACIÓN PARA PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Devenir es adecuado para los programas de manejo integrado de plagas porque tiene baja toxicidad para las poblaciones de insectos y ácaros beneficiosos (incluidas las abejas y los abejorros).

NOTIFICACIÓN SOBRE LA DERIVA DE LA ASPERSIÓN

EL APLICADOR ES RESPONSABLE DE EVITAR LA DERIVA DE LA ASPERSIÓN FUERA DEL SITIO DE APLICACIÓN.

TENGA PRESENTE LOS SITIOS CERCANOS QUE NO FORMAN PARTE DEL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

IMPORTANCIA DEL TAMAÑO DE LA MICROGOTA

Una manera eficaz de reducir el potencial de deriva es aplicar microgotas de mayor tamaño. Aplique las microgotas más grandes que proporcionen el control de la plaga objetivo. Aunque aplicar microgotas más grandes reducirá la deriva de la aspersión, la posibilidad de deriva será mayor si las aplicaciones se hacen de manera incorrecta o bajo condiciones ambientales desfavorables.

Control del tamaño de las microgotas – Barra aspersora terrestre

- **Volumen:** El aumento del volumen de aspersión para producir microgotas más grandes reducirá la deriva. Utilice el mayor volumen de aspersión posible para la aplicación. Si se necesita un mayor volumen de aspersión, considere utilizar una boquilla con un caudal más alto.
- **Presión:** Utilice la presión de aspersión más baja recomendada para la boquilla con el fin de producir el volumen de aplicación y el tamaño de microgota deseados. Si se necesita un mayor volumen de aspersión, considere utilizar una boquilla con un caudal más alto en lugar de aumentar la presión.
- **Boquilla aspersora:** Utilice una boquilla diseñada para la aplicación prevista. Considere utilizar boquillas diseñadas para reducir la deriva.

ALTURA DE LA BARRA – Barra aspersora terrestre

En el caso de equipo terrestre, la barra aspersora debe mantenerse a la altura del cultivo y con un rebote mínimo.

ASPERSORES CON PANTALLA PROTECTORA: Colocar pantallas protectoras en la barra aspersora o en las boquillas individuales puede reducir la deriva del producto. Considere utilizar aspersores con pantalla protectora. Verifique que las pantallas protectoras no interfieran con el depósito uniforme de la aspersión sobre el área objetivo.

TEMPERATURA Y HUMEDAD: Al realizar aplicaciones en condiciones atmosféricas cálidas y secas, utilice microgotas más grandes para reducir los efectos de la evaporación.

INVERSIONES TÉRMICAS: El potencial de deriva es alto durante las inversiones térmicas. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura con la altitud y son comunes en las noches con nubosidad limitada y poco o nada de viento. La presencia de una inversión puede manifestarse en forma de niebla sobre el suelo o por el movimiento de humo desde una fuente terrestre o de un generador de humo de una aeronave. El humo que se acumula y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (bajo condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que sube y se disipa rápidamente indica una buena mezcla de aire vertical. Evite las aplicaciones durante inversiones térmicas.

VIENTO: Por lo general, el potencial de deriva aumenta con la velocidad del viento. EVITE LAS APLICACIONES DURANTE CONDICIONES CON RÁFAGAS DE VIENTO. Los aplicadores deben familiarizarse con los patrones de viento locales y el terreno que podrían afectar la deriva de la aspersión.

Aplicaciones con tecnología portátil: Tome precauciones para minimizar la deriva de la aspersión.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplicación foliar

Las tasas se indican en la sección **Instrucciones de uso**. Aplique **Devenir** cuando las poblaciones de plagas sean bajas para evitar que aumenten hasta alcanzar niveles perjudiciales.

Cuando realice aplicaciones foliares a plantas con follaje difícil de humedecer, como el acebo, la hiedra o el pino, se recomienda agregar un surfactante no iónico o a base de organosilicona para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones de uso y las recomendaciones de tasa del producto. Si se utiliza equipo de aplicación de concentrado, de tipo nebulizador u otro equipo de aplicación de bajo volumen para aplicar **Devenir**, aplique la misma cantidad de producto por área que utilizaría si realizara aplicaciones con volúmenes de aplicación más altos.

Aplicaciones por empapado al medio de cultivo

Devenir puede aplicarse al medio de cultivo de plantas cultivadas en contenedores para controlar las plagas de insectos indicadas. Aplique **Devenir** cuando las poblaciones de plagas sean bajas para evitar que aumenten hasta alcanzar niveles perjudiciales. Aplique

al medio de cultivo húmedo. Evite la lixiviación. Para la aplicación a plántulas para trasplante y plantines, no aplique por empapado al medio de cultivo hasta que se haya reanudado el crecimiento de las raíces. El riego excesivo después de la aplicación podría reducir el control de insectos. Para las aplicaciones por empapado, prepare una solución de empapado diluida mezclando **Devenir** con agua a la tasa especificada en la sección **Instrucciones de uso**. Aplique la solución de empapado a los contenedores, lechos planos, bandejas, bancos o lechos de acuerdo con las tasas de aplicación indicadas. El volumen de empapado deberá ser suficiente para humedecer completamente el medio de cultivo sin que se desborde ni se produzca lixiviación del contenedor. Riegue durante los siete (7) días siguientes al tratamiento para evitar la lixiviación.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Utilice boquillas de aspersión que produzcan una aplicación exacta y uniforme. Calibre el aspersor para asegurar la distribución de un volumen de aspersión adecuado por unidad de superficie. Para evitar la deriva de la aspersión, no aplique el producto cuando las condiciones favorezcan la deriva fuera del área a tratar. Evite la superposición de las franjas de aspersión porque se podría dañar el cultivo.

VOLUMEN DE APLICACIÓN Y COBERTURA DE ASPERSIÓN

Utilice suficiente agua para proveer una cobertura completa y uniforme.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

No prepare más mezcla que la necesaria para su aplicación inmediata. Antes de usar este producto limpie bien el equipo de aspersión. Es necesario que el producto se agite energicamente para que se disperse de manera adecuada. Mantenga la máxima agitación durante toda la aplicación. No deje reposar la mezcla de aspersión durante la noche en el tanque de aspersión. Purgue completamente el equipo aspersor después de cada uso y aplique el enjuague a un área ya tratada.

Devenir solo

1. Añada la mitad de la cantidad de agua necesaria al tanque de mezcla.
2. Con el agitador en funcionamiento, agregue **Devenir** al tanque.
3. Continúe la agitación mientras agrega el resto del agua.
4. Comience a aplicar la solución después de que **Devenir** se haya dispersado totalmente en el agua de la mezcla.
5. Mantenga la agitación hasta que se haya aplicado toda la mezcla.

Precauciones para el mezclado en tanque

- Si se utiliza **Devenir** en mezclas en tanque, todos los productos en envases solubles en agua deben agregarse al tanque antes de cualquier otro componente de mezcla en tanque, incluido **Devenir**.
- Deje que el envase soluble en agua se disuelva por completo y que el o los productos se dispersen por completo antes de añadir al tanque cualquier otro componente de mezcla en tanque.
- **Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.** No se debe exceder la tasa de la etiqueta. Este producto no debe mezclarse con ningún producto que prohíba dicha mezcla. Las mezclas en tanque u otras aplicaciones de los productos mencionados en esta etiqueta sólo se permiten en las jurisdicciones donde se han etiquetado los productos referidos.

Compatibilidad para mezcla en tanque

Devenir es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. No obstante, debe probarse la compatibilidad física de **Devenir** con los componentes de mezcla en tanque antes del uso. Para evaluar la compatibilidad física de **Devenir** con otros productos, haga una prueba en frasco.

Utilice un frasco con capacidad para 1½ cuartos de galón y agregue las cantidades proporcionales de los productos a 1 cuarto de galón de agua. Añada primero los

polvos humectables y los gránulos dispersables en agua, luego los líquidos fluidos (suspensiones concentradas) y, por último, los concentrados emulsionables. Después de mezclar completamente, deje reposar por al menos 5 minutos. Si la combinación permanece mezclada o puede volver a mezclarse fácilmente, es físicamente compatible. Una vez comprobada la compatibilidad, utilice el mismo procedimiento para agregar los ingredientes necesarios al tanque de aspersión.

Prueba de compatibilidad: Debido a que los pesticidas, coadyuvantes y fertilizantes pueden variar en calidad, siempre verifique la compatibilidad de la mezcla en tanque con los componentes de mezcla en tanque antes de cada uso. Preste especial atención al utilizar fertilizantes líquidos o de suspensión completa como vehículo o portador, ya que es probable que surjan problemas graves de compatibilidad con esos productos. Un equipo de aplicación comercial puede mejorar la compatibilidad para mezcla en tanque en ciertas instancias. La siguiente prueba supone un volumen de aspersión de 25 galones/acre. Para otros volúmenes de aspersión, haga los cambios correspondientes en los componentes. Compruebe la compatibilidad de la mezcla en tanque mediante este procedimiento:

1. Agregue 1 pinta de vehículo (ya sea agua o fertilizante líquido que se utilizará en la aplicación por aspersión) a cada uno de dos frascos transparentes de 1 cuarto de galón de capacidad con tapas herméticas.
2. A uno de los frascos, añada 1/4 de cucharadita o 1.2 ml de un agente de compatibilidad de mezcla en tanque disponible en el mercado y aprobado para este uso (1/4 de cucharadita equivale a 2 pintas/100 galones de aspersión). Invierta el frasco y luego agítelo o revuélvalo suavemente para asegurar una mezcla completa.
3. Añada a los dos frascos la cantidad adecuada de cada componente de mezcla en tanque. Si se va a utilizar más de un componente de mezcla en tanque, añádalos por separado con las formulaciones secas (polvos humectables o gránulos dispersables en agua), seguidas de los líquidos fluidos, las suspensiones en cápsulas, los concentrados emulsionables y, por último, añada los coadyuvantes. Después de agregar cada ingrediente, invierta el frasco, agite o revuelva suavemente para que se mezcle bien. La cantidad adecuada de cada componente de mezcla en tanque para esta prueba es la siguiente:
 - a. **Formulaciones secas:** Agregue los ingredientes de la mezcla en tanque en sus proporciones relativas; por ejemplo, por cada libra que se aplicará por acre, agregue 3/4 de cucharadita al ras a cada frasco.
 - b. **Formulaciones líquidas:** Agregue los ingredientes de la mezcla en tanque en sus proporciones relativas; por ejemplo, por cada pinta que se aplicará por acre, agregue 0.5 cucharaditas o 2.5 ml a cada frasco.
4. Después de agregar todos los ingredientes, coloque las tapas y apriételas; luego, invierta cada frasco 10 veces para mezclar completamente. Deje reposar las mezclas de 15 a 30 minutos y luego evalúelas en busca de separación, escamas grandes, precipitados, geles, película aceitosa pesada en el frasco u otros indicios de incompatibilidad. Compare los dos frascos para determinar si se necesita un agente de compatibilidad en la mezcla de aplicación. Si cualquiera de las dos mezclas se separa pero se puede volver a mezclar fácilmente, la mezcla se puede rociar siempre que se agite bien. Si las mezclas son incompatibles, pruebe los siguientes métodos para mejorar la compatibilidad: (A) Prepare una suspensión de las formulaciones secas en agua antes de agregarlas, o (B) agregue el agente de compatibilidad directamente a las formulaciones líquidas antes de agregarlas a la mezcla en tanque. Si se siguen estos procedimientos pero se sigue observando incompatibilidad, no utilice la mezcla del tanque.

Devenir en mezclas en tanque

Si la mezcla es físicamente compatible, añada la mitad de la cantidad de agua necesaria al tanque de mezcla. Ponga en marcha el agitador antes de añadir cualquier componente de mezcla en tanque. Agregue los productos en este orden: (1) productos empacados en envases solubles en agua, (2) polvos humectables, (3) gránulos dispersables en agua (gránulos secos fluidos) tales como **Devenir**, (4) líquidos fluidos, (5) líquidos y (6) concentrados emulsionables.

Siempre permita que se disperse totalmente cada componente de la mezcla en tanque antes de agregar el producto siguiente. Suministre agitación suficiente mientras agrega el resto del agua. Mantenga la agitación hasta que se haya aplicado toda la mezcla.

Aditivos de aspersión

Cuando se vaya a usar un coadyuvante con **Devenir**, se recomienda utilizar uno que cumpla con las normas del programa de certificación del Consejo de Productores y Distribuidores de Agrotecnología (CPDA, por sus siglas en inglés).

En las plantas difíciles de mojar, añada un tensioactivo no iónico o de organosilicona para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones de uso y las recomendaciones de tasa del producto.

APLICACIÓN MEDIANTE SISTEMAS DE RIEGO (IRRIGACIÓN QUÍMICA)

IRRIGACIÓN QUÍMICA

Devenir puede aplicarse mediante inyección en un sistema de riego, ya sea solo o en combinación con otros pesticidas o productos químicos registrados para su aplicación mediante sistemas de riego. Las proporciones de dilución de **Devenir** normalmente son de 1:100 a 1:200, según el sistema.

Aplice **Devenir** a las plantas indicadas mediante microrriego (microtubos individuales), riego por goteo, riego mediante aspersión elevada o equipo de riego motorizado. Aplice **Devenir** de acuerdo con las instrucciones de uso y no de acuerdo con el programa de riego, a menos que ambos eventos coincidan. En general, ajuste el equipo para aplicar la cantidad mínima de agua por acre.

- Aplique con equipo de pivote central o de movimiento continuo a un volumen de ½ pulgada-acre (13 mm-acre) o menos durante el tratamiento. En general, utilice la menor cantidad de agua necesaria para lograr una distribución y cobertura adecuadas.
- Si se utilizan sistemas estacionarios, como sistemas fijos, líneas manuales o líneas con ruedas que no sean de movimiento continuo, este producto deberá inyectarse durante no más de los últimos 20 a 30 minutos del ciclo de riego.

Precauciones de uso de la irrigación química

- La agitación debe mantenerse durante todo el período de aplicación para asegurar una irrigación química uniforme.
- Para aplicaciones foliares, se requiere una cobertura completa del follaje a fin de obtener el mejor control. La distribución no uniforme puede provocar daños al cultivo o una reducción de la eficacia. El uso excesivo de agua también puede reducir la eficacia.

Restricciones de uso de la irrigación química

- No lo aplique mediante ningún tipo de sistema de riego que no figure en esta etiqueta.
- No haga aplicaciones foliares cuando la velocidad del viento supere las 10 a 15 millas/hora (16 a 24 km/h) para evitar la deriva o saltos causados por el viento.
- No conecte un sistema de riego, incluidos los sistemas de invernadero, utilizado para aplicaciones de pesticidas a un sistema público de abastecimiento de agua, a menos que se hayan implementado los dispositivos de seguridad indicados en la etiqueta del pesticida para los sistemas públicos de abastecimiento de agua. Consulte la sección **Instrucciones específicas para sistemas públicos de abastecimiento de agua**.
- Compruebe con las agencias reguladoras estatales y locales las posibles restricciones de uso antes de aplicar cualquier producto agroquímico mediante equipo de riego por aspersión.

Una persona que conozca el sistema de irrigación química y sea responsable de su funcionamiento, o que actúe bajo la supervisión de la persona responsable, apagará el sistema y hará los ajustes cuando sea necesario. Si tiene preguntas sobre calibración, comuníquese con los especialistas del servicio de extensión agrícola estatal, los fabricantes del equipo u otros expertos.

Instrucciones de funcionamiento para equipos de irrigación química

1. El sistema debe contener una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de vacío y un desagüe de baja presión ubicados adecuadamente en la tubería de riego para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo.

2. La tubería de inyección de pesticidas debe tener una válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el líquido vuelva a la bomba de inyección.
3. La tubería de inyección de pesticidas también debe incluir una válvula de solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de admisión de la bomba de inyección, y debe estar conectada al enclavamiento del sistema para evitar que se extraiga líquido del tanque de abastecimiento de productos químicos cuando el sistema de riego se apague automáticamente o manualmente.
4. El sistema debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detenga el motor de la bomba de agua.
5. La tubería de riego o la bomba de agua debe incluir un presostato funcional que detenga el motor de la bomba de agua cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que se vea afectada negativamente la distribución del pesticida.
6. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (p. ej., una bomba de diafragma), diseñada eficazmente y construida con materiales compatibles con los pesticidas y que pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
7. No aplique la mezcla cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área a tratar.

Instrucciones específicas para sistemas públicos de abastecimiento de agua

Por sistema público de abastecimiento de agua se entiende un sistema de suministro al público de agua corriente para el consumo humano si dicho sistema tiene al menos 15 conexiones de servicio o surte regularmente a un promedio de al menos 25 personas diariamente por lo menos 60 días al año.

1. Los sistemas de irrigación química conectados a los sistemas públicos de abastecimiento de agua deben contener una zona de presión reducida funcional, un dispositivo antirretorno o su equivalente funcional en la tubería de abastecimiento de agua corriente aguas arriba del punto de inyección del pesticida. Como alternativa a la zona de presión reducida, el agua de sistemas públicos de abastecimiento debe descargarse en un depósito de reserva antes de la inyección del pesticida. Entre el extremo de salida de la tubería de llenado y el borde superior o de desborde del tanque de reserva debe haber una interrupción física completa (espacio de aire) de al menos dos veces el diámetro interior de la tubería de llenado.
2. La tubería de inyección de pesticidas debe estar provista de una válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el líquido vuelva a la bomba de inyección.
3. La tubería de inyección de pesticidas debe tener una válvula de solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de admisión de la bomba de inyección y conectada al enclavamiento del sistema para evitar que se extraiga líquido del tanque de abastecimiento de producto químico cuando el sistema de riego se apague automáticamente o manualmente.
4. El sistema debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detenga el motor de la bomba de agua o, en los casos en que no haya bomba de agua, cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que se vea afectada negativamente la distribución del pesticida.
5. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (p. ej., una bomba de diafragma), diseñada eficazmente y hecha con materiales compatibles con pesticidas y que pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
6. No aplique el producto cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área a tratar.

INSTRUCCIONES DE USO

PLANTAS ORNAMENTALES

Cultivos de mejoramiento genético; cultivos de bulbos, cormos y tubérculos (como tulipanes, calas); plantas de hoja perenne, incluidas coníferas; plantas con flores; plantas con flores cultivadas para la producción de semillas; plantas de follaje; cubiertas vegetales; palmas; plantas perennes; plantas en maceta y plantines; arbustos; árboles, incluidos los árboles frutales y de frutos secos no productivos*; enredaderas (no productivas)*

FOLIAR

Plagas objetivo	TASA (oz/100 galones)	Intervalos de aplicación	Instrucciones de uso
Moscas blancas, tales como: Mosca blanca de hoja plateada <i>(Bemisia agentifolii)</i> Mosca blanca de invernaderos <i>(Trialeurodes vaporariorum)</i> Áfidos, tales como: Pulgón verde del duraznero <i>(Myzus persicae)</i> Pulgón del melón <i>(Aphis gossypii)</i>	2.5 a 5.0 (10 oz/acre como tasa máxima)	Presión severa de insectos: 7 días Presión normal de insectos: 14 días	Haga aplicaciones foliares o por irrigación química. Aplique uniformemente la mezcla de aspersión foliar a todas las superficies de las plantas, particularmente en los tallos y la parte inferior de las hojas hasta el punto de escorrentía. Consulte la sección titulada Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química) a fin de obtener instrucciones adicionales para la irrigación química. En las plantas difíciles de mojar, añada un tensioactivo no iónico o de organosilicona para mejorar la cobertura. Siga las instrucciones de uso y las recomendaciones de tasa del producto. Aplique cuando aparezcan las plagas objetivo y las condiciones no favorezcan la deriva fuera del área objetivo.
Precauciones: - Evite la superposición de las franjas de aspersión que podrían causar fitotoxicidad. - No debe aplicarse en nochebuenas después del desarrollo de las brácteas.			
Restricciones de uso: Tasa máxima de aplicación única: 10 oz (0.31 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina. Tasa máxima anual: Aplicaciones en exteriores: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. Aplicaciones en interiores: No aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. Aplicaciones en California: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días Intervalo de precosecha: NC *Los árboles y las enredaderas no productivos son plantas que no producirán frutos comestibles ni frutos secos comestibles durante un año (365 días) después de la aplicación.			

EMPAPADO

Plagas objetivo	Solución de empapado (oz/100 galones)	Volúmenes de aplicación sugeridos**		Instrucciones de uso
Pulgones Moscas blancas, tales como: Mosca blanca de hoja plateada (<i>Bemisia</i> spp. – Biotipos B y Q) Mosca blanca de invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	5.0	Tamaño del contenedor (pulgadas)	Fl oz de solución para empapado/contenedor	Aplique mediante aspersión dirigida al suelo con equipo de aplicación terrestre o mediante irrigación química. Consulte la sección titulada Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química) a fin de obtener instrucciones adicionales para la irrigación química. Comience las aplicaciones antes de que las plagas aparezcan por primera vez. Use las tasas más altas indicadas cuando se requiera un control residual más prolongado.
		4	3	
		5	4	
		6	4	
		7	7	
		8	10	
		10	20 a 25	
		Para los contenedores más grandes, aplique de 6 a 8 fl oz de solución de empapado por galón de medio de cultivo.		
		Para lechos planos, bandejas, bancos o lechos, aplique una cantidad suficiente de solución de empapado para humedecer adecuadamente el medio de cultivo sin que se produzca lixiviación.		
Restricciones de uso: ▪ Tasa máxima de aplicación única: 10 oz (0.31 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina ▪ Tasa máxima anual: ▪ Aplicaciones en exteriores: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Aplicaciones en interiores: No aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Aplicaciones en California: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días ▪ Intervalo de precosecha: NC *Los árboles y las enredaderas no productivos son plantas que no producirán frutos comestibles ni frutos secos comestibles durante un año (365 días) después de la aplicación. **Ajuste el volumen de empapado según corresponda para asegurar una humectación completa de la zona radicular sin que el producto se lixivie del envase.				

HORTALIZAS - APLICACIÓN FOLIAR

COLES

Brócoli, rapini, col de Bruselas, col, coliflor, brócoli italiano, brócoli chino, col china (bok choy, napa), mostaza china, berza, kale, colinabo, mizuna, hojas de mostaza, espinaca de mostaza, hojas de colza, hojas de nabo

Plagas objetivo	TASA (oz/acre)	Instrucciones de uso
Pulgones Pulgón de la col Pulgón verde del duraznero Pulgón del nabo Moscas blancas (supresión)	2.75 (0.31 oz por cada 5000 pies cuadrados [465 m ²])	Haga aplicaciones foliares o por irrigación química. Consulte la sección titulada Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química) a fin de obtener instrucciones adicionales para la irrigación química. Aplique cuando aparezcan por primera vez las plagas, antes de que la población aumente hasta niveles perjudiciales. Para lograr el control, podrían necesitarse dos aplicaciones con un intervalo de 14 días.

Restricciones de uso:

- **Tasa máxima de aplicación única:** 2.75 oz (0.086 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina.
- **Tasa máxima por cultivo:** 5.5 oz (0.17 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina.
- **Tasa máxima anual:**
 - **Aplicaciones en exteriores:** No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina.
 - **Aplicaciones en interiores:** No aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina.
 - **Aplicaciones en California:** No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina.
- No haga más de 2 aplicaciones por año a la tasa máxima de aplicación individual actualmente indicada en la etiqueta para brócoli, coliflor, col y espinaca.
- Aplique únicamente a hortalizas cultivadas para su venta a los consumidores.
- Deje transcurrir un mínimo de 7 días (PHI) entre la última aplicación y la venta o el envío de las hortalizas destinadas a la venta a los consumidores.

HORTALIZAS CUCURBITÁCEAS

Chayote; calabaza china (calabaza de la cera); melón cidra; pepino; calabaza de peregrino comestible; pepinillo; momordica spp.; melón común; calabaza; calabacín (de verano, de invierno); sandía

Plagas objetivo	TASA (oz/acre)	Instrucciones de uso
Pulgones Pulgón verde del duraznero Pulgón del melón Moscas blancas (supresión)	2.75 (0.31 oz por cada 5000 pies cuadrados [465 m ²])	Haga aplicaciones foliares o por irrigación química. Consulte la sección titulada Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química) a fin de obtener instrucciones adicionales para la irrigación química. Aplique cuando aparezcan por primera vez las plagas, antes de que la población aumente hasta niveles perjudiciales. Para lograr el control, podrían necesitarse dos aplicaciones con un intervalo de 14 días.

Restricciones de uso:

- **Tasa máxima de aplicación única:** 2.75 oz (0.086 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina.
- **Tasa máxima por cultivo:** 5.5 oz (0.17 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina.
- **Tasa máxima anual:**
 - **Aplicaciones en exteriores:** No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina.
 - **Aplicaciones en interiores:** No aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina.
 - **Aplicaciones en California:** No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina.
- No haga más de 2 aplicaciones por año a la tasa máxima de aplicación individual actualmente indicada en la etiqueta para calabaza, calabacín y sandía.
- Aplique únicamente a hortalizas cultivadas para su venta a los consumidores.
- Deje transcurrir un mínimo de 7 días (PHI) entre la última aplicación y la venta o el envío de las hortalizas destinadas a la venta a los consumidores.

HORTALIZAS DE FRUTO

Berenjena, coztomate (alquejenje), pepino, pimientos (acampanado, chile, morrón, pimienta común y pimienta dulce), tomatillo y tomate

Plagas objetivo	TASA (oz/acre)	Instrucciones de uso
Pulgones Pulgón verde del duraznero Pulgón de la papa Moscas blancas (supresión)	2.75 (0.31 oz por cada 5000 pies cuadrados [465 m ²])	Haga aplicaciones foliares o por irrigación química. Consulte la sección titulada Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química) a fin de obtener instrucciones adicionales para la irrigación química. Aplique cuando aparezcan por primera vez las plagas, antes de que la población aumente hasta niveles perjudiciales. Para lograr el control, podrían necesitarse dos aplicaciones con un intervalo de 14 días.
Restricciones de uso: ▪ Tasa máxima de aplicación única: 2.75 oz (0.086 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina. ▪ Tasa máxima por cultivo: 5.5 oz (0.17 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina. ▪ Tasa máxima anual: ▪ Aplicaciones en exteriores: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Aplicaciones en interiores: No aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Aplicaciones en California: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ No haga más de 2 aplicaciones por año a la tasa máxima de aplicación individual actualmente indicada en la etiqueta para pimientos y tomates. ▪ Aplique únicamente a hortalizas cultivadas para su venta a los consumidores. ▪ Deje transcurrir un mínimo de 7 días (PHI) entre la última aplicación y la venta o el envío de las hortalizas destinadas a la venta a los consumidores.		

HORTALIZAS DE HOJA

Amaranto; rúcula; cardo; apio; celtuce (lechuga de tallo); perifollo; apio chino; valeriana comestible; diente de león; acedera (vinagrera); crisantemo de hojas comestibles; endibia (escarola); hinojo de Florencia; berro hortelano; verdolaga de huerto; crisantemo de guirnalda; lechuga arropollada; lechuga de hoja; armuelle (orach); perejil; radicchio; ruibarbo; espinaca; acelga; berro de invierno; verdolaga de invierno

Plagas objetivo	TASA (oz/acre)	Instrucciones de uso
Pulgones Pulgón del frijol Pulgón verde del duraznero Pulgón de la lechuga Pulgón de la papa Pulgón rojo de la lechuga Moscas blancas	2.75 (0.31 oz por cada 5000 pies cuadrados [465 m ²])	Haga aplicaciones foliares o por irrigación química. Consulte la sección titulada Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química) a fin de obtener instrucciones adicionales para la irrigación química. Aplique cuando aparezcan por primera vez las plagas, antes de que la población aumente hasta niveles perjudiciales. Para lograr el control, podrían necesitarse dos aplicaciones con un intervalo de 14 días.
Restricciones de uso: ▪ Tasa máxima de aplicación única: 2.75 oz (0.086 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina. ▪ Tasa máxima por cultivo: 5.5 oz (0.17 lb de i.a.) por acre de productos que contengan pimetrozina. ▪ Tasa máxima anual: ▪ Aplicaciones en exteriores: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Aplicaciones en interiores: No aplique más de 100 oz (3.125 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ Aplicaciones en California: No aplique más de 40 oz (1.25 lb de i.a.) por acre y por año de productos que contengan pimetrozina. ▪ No haga más de 2 aplicaciones por año a la tasa máxima de aplicación individual actualmente indicada en la etiqueta para lechuga y apio. ▪ Aplique únicamente a hortalizas cultivadas para su venta a los consumidores. ▪ Deje transcurrir un mínimo de 7 días (PHI) entre la última aplicación y la venta o el envío de las hortalizas destinadas a la venta a los consumidores.		

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Mantenga este producto en su envase original muy bien cerrado. El producto es higroscópico. Almacene el producto en un área fresca y seca (preferentemente bajo llave), lejos de otros pesticidas, fertilizantes, alimentos o forraje, y fuera del alcance de niños y animales.

DESECHO DE PESTICIDAS: La mezcla de aplicación del pesticida o el agua resultante del enjuague del equipo que no se pueda usar debe desecharse en un área para desechos sanitarios aprobada para pesticidas. La eliminación inadecuada de pesticida sobrante, mezclas de aplicación o aguas de enjuague o lavado de envases constituye una violación de la Ley Federal (EE. UU.). Si estos residuos no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, contacte a la agencia para el manejo de pesticidas o control ambiental de su estado, o al representante para el Manejo de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener indicaciones del proceso a seguir para su eliminación.

MANIPULACIÓN DE ENVASES:

Bolsa: Bolsa externa no rellenable. No reutilice ni vuelva a llenar la bolsa externa. Vacíe completamente la bolsa en el equipo de aplicación. Luego elimine la bolsa vacía en un relleno sanitario o por otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

Envase de plástico: Envase no rellenable. No reutilice ni vuelva a llenar este envase. Enjuague tres veces (o equivalente) el envase inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o en un tanque de mezclar. Llene el envase ¼ con agua y tape de nuevo. Agite por 10 segundos. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca el envase para su reciclaje, si está disponible, o perforélo y deséchelo en un área adecuada para desechos sanitarios o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR. Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Podrían producirse daños, ineficacia y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores como la forma de uso o aplicación (incluido el uso indebido), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, todo lo cual está fuera del control de ATTICUS, LLC. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el usuario o el comprador asumirá todos los riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: En la medida en que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, aparte de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida en que lo permita la ley pertinente, ni ATTICUS, LLC, ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ningún daño indirecto, especial, incidental o consecuente que resulte del uso, la manipulación, la aplicación, el almacenamiento o la eliminación de este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, la manipulación, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

Devenir es marca comercial de Atticus, LLC.

Endeavor® es marca registrada de Syngenta Group Company.

20260716a