



Contiene etoxazol, el ingrediente activo utilizado en Zeal® SC Miticide.

INGREDIENTE ACTIVO:	(% por peso)
Etoxazol (2-(2,6-difluorofenil)-4-[4-(1,1-dimetiletil)-2-etoxifenil]-4,5-dihidrooxazol).....	31.7%
OTROS INGREDIENTES:.....	68.3%
TOTAL:.....	100.0%
Contiene 2.88 lb de etoxazol por galón (345 g/L).	
N.º de reg. de EPA: 91234-72	

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Consulte las declaraciones de precaución adicionales más adelante.

NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar a SafetyCall al 1-844-685-9173 para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.

En caso de emergencia química:

En caso de derrame, fuga, incendio, exposición o accidente,
llame a CHEMTREC, de día o de noche

Dentro de los EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 o +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)

Zara™ SC no es fabricado ni distribuido por Valent U.S.A. Corporation, vendedor de Zeal® SC Miticide.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PELIGROSO PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS PRECAUCIÓN

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los aplicadores y otros manipuladores deben usar: camisa de manga larga y pantalones largos, zapatos y calcetines, y guantes resistentes a productos químicos hechos de laminados impermeables, goma de butilo, goma de nitrilo, goma de neopreno, goma natural, polietileno, cloruro de polivinilo o Viton® de ≥ 14 milipulgadas (0.36 mm) de espesor en todos los casos.

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.
- Si el pesticida se introduce en la ropa, quitársela inmediatamente. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto sea posible, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE:

Este pesticida es tóxico para los invertebrados acuáticos de agua dulce y marinos/estuarinos, incluidos los camarones y las ostras. No lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva desde las áreas tratadas. La deriva y las escorrentías desde las áreas tratadas pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos en aguas adyacentes a las áreas tratadas. No contamine cuerpos de agua cuando disponga de las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la ley federal utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta.

LEA TODA LA ETIQUETA. UTILICE EL PRODUCTO CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LAS DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN, LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LOS REGLAMENTOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES.

No aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Sólo se permite la presencia de los manipuladores del producto con protección adecuada en el área durante su aplicación. Si desea obtener información acerca de los requisitos específicos para su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Utilice este producto sólo de acuerdo con su etiqueta y el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS, por sus siglas en inglés), 40 CFR Parte 170. Dicho estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene requisitos para la capacitación, descontaminación, notificación y asistencia de emergencia. También contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de la etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal (PPE) y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos en esta sección de la etiqueta (requisitos para uso agrícola) aplican únicamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS).

No ingrese ni permita la entrada de trabajadores a las áreas tratadas durante el intervalo de acceso restringido de 12 horas.

El PPE requerido para el acceso anticipado a áreas tratadas (de acuerdo con el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola, y que involucra el contacto con cualquier elemento que se haya tratado, como plantas, suelo o agua) consiste en: camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos y calcetines, y guantes resistentes a productos químicos.

Siempre mezcle bien el producto antes de usarlo.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

Para el manejo de la resistencia, **Zara SC** contiene un insecticida del Grupo 10B. Cualquier población de insectos puede contener individuos naturalmente resistentes a **Zara SC** y a otros insecticidas del Grupo 10B. Los individuos resistentes pueden dominar la población de insectos si este grupo de insecticidas se usa repetidamente en los mismos campos. Se deben seguir estrategias apropiadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia a los insecticidas, siga estos pasos:

- Rote la aplicación de **Zara SC** u otros insecticidas del Grupo 10B dentro de una temporada de cultivo, o entre temporadas de cultivo, con diferentes grupos de insecticidas que controlan las mismas plagas.
- Use mezclas en tanque con insecticidas de un grupo diferente que sean igualmente eficaces en la plaga objetivo cuando se permita dicho uso. No confíe en la misma mezcla repetidamente para la misma población de plagas. Tenga en cuenta todos los problemas conocidos de resistencia cruzada (para las plagas objetivo) entre los componentes individuales de una mezcla. Además, considere las siguientes recomendaciones proporcionadas por el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas (IRAC, por sus siglas en inglés):
 - Los insecticidas individuales seleccionados para su uso en mezclas deben ser altamente eficaces y aplicarse en las concentraciones a las que se registran individualmente para su uso contra las especies objetivo.
 - No se recomiendan las mezclas con componentes que tengan la misma clasificación de modo de acción del IRAC para el manejo de la resistencia de los insectos.
 - Al usar mezclas, tome en cuenta todos los problemas conocidos de resistencia cruzada entre los componentes individuales para la(s) plaga(s) objetivo.
 - Las mezclas se vuelven menos eficaces si ya se está desarrollando resistencia a uno de los ingredientes activos o ambos, pero igualmente pueden brindar beneficios para el manejo de plagas.
 - Los beneficios del manejo de la resistencia de los insectos de una mezcla de insecticidas son mayores si los dos componentes tienen períodos similares de actividad insecticida residual. Las mezclas de insecticidas con períodos desiguales de actividad insecticida residual pueden ofrecer un beneficio de manejo de la resistencia de los insectos sólo durante el período en el que ambos insecticidas están activos.
- Adopte un programa de manejo integrado de plagas para el uso de insecticidas que incluya exploración, que emplee información histórica relacionada con el uso de pesticidas, la rotación de cultivos, el mantenimiento de registros, y que considere prácticas de cultivo, biológicas y otros métodos de control químico.
- Monitoree el área tras la aplicación para detectar la supervivencia imprevista de plagas objetivo. Si el nivel de supervivencia sugiere una posible resistencia, consulte con su especialista universitario local o con un asesor certificado en control de plagas.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local o asesores certificados en cultivos para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de la resistencia a los pesticidas y/o el manejo integrado de plagas para el sitio específico y los problemas de plagas en su área.

Para obtener información o para reportar una presunta resistencia, llame a Atticus, LLC al (984) 465-4800.



Restricciones para evitar la deriva del rociado

Aplicaciones aéreas

- No libere el rociado a una altura superior a 10 pies (3 m) por encima del dosel vegetal, a menos que se necesite una altura mayor por la seguridad del piloto.
- Los aplicadores deben seleccionar boquillas y presiones que suministren microgotas medianas o más gruesas (ASABE S572.1).
- Cuando la velocidad del viento sea igual o inferior a 10 millas por hora (16 km/h), los aplicadores deben usar 1/2 pasada de desplazamiento contra el viento en el borde del campo a favor del viento. Cuando la velocidad del viento sea entre 11 y 15 millas por hora (17 y 24 km/h), los aplicadores deben usar 3/4 pasada de desplazamiento contra el viento en el borde del campo a favor del viento.
- No lo aplique cuando la velocidad del viento supere las 15 millas por hora (24 km/h) en el lugar de aplicación. Si la velocidad del viento es superior a 10 millas por hora (16 km/h), la longitud de la barra rociadora debe ser igual o inferior al 65% de la envergadura del ala en el caso de aeronaves de ala fija e igual o inferior al 75% del diámetro del rotor en el caso de helicópteros. De lo contrario, la longitud de la barra rociadora debe ser igual o inferior al 75% de la envergadura del ala en el caso de aeronaves de ala fija e igual o inferior al 90% del diámetro del rotor en el caso de helicópteros.
- No lo aplique durante inversiones térmicas.

Aplicaciones con aspersor neumático

- El rociado debe dirigirse al dosel.
- No lo aplique cuando la velocidad del viento supere las 15 millas por hora (24 km/h) en el lugar de aplicación.
- El usuario debe cerrar las boquillas que apuntan hacia afuera en los extremos de las hileras y al rociar la hilera exterior.
- No lo aplique durante inversiones térmicas.

Aplicaciones con barra rociadora terrestre

- El usuario solamente debe aplicar el producto a la altura de liberación recomendada por el fabricante, pero no más de 4 pies (1.2 m) por encima del suelo o del dosel del cultivo.
- Los aplicadores deben seleccionar boquillas y presiones que suministren microgotas medianas o más gruesas (ASABE S572.1).
- No lo aplique cuando la velocidad del viento supere las 15 millas por hora (24 km/h) en el lugar de aplicación.
- No lo aplique durante inversiones térmicas.

Aplicaciones terrestres sin barra rociadora:

- Los aplicadores deben utilizar un tamaño de microgota mediano o mayor (ASABE S572.1) para todas las aplicaciones.
- No lo aplique cuando la velocidad del viento supere las 15 millas por hora (24 km/h) en el lugar de aplicación.
- No lo aplique durante inversiones térmicas.

Advertencias sobre la deriva del producto

EL APLICADOR ES RESPONSABLE DE EVITAR LA DERIVA DEL ROCIADO FUERA DEL SITIO.

TENGA PRESENTE LOS LUGARES CERCANOS QUE NO SON OBJETIVO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

IMPORTANCIA DEL TAMAÑO DE LA MICROGOTA

Una manera eficaz de reducir el potencial de deriva es aplicar microgotas grandes. Aplique las microgotas más grandes que proporcionen el control de la plaga objetivo. Aunque aplicar microgotas más grandes reducirá la deriva del rociado, la posibilidad de deriva será mayor si las aplicaciones se hacen de manera incorrecta o bajo condiciones ambientales desfavorables.

Cómo controlar el tamaño de las microgotas - Barra rociadora terrestre

- Volumen: El aumento del volumen de rociado para producir microgotas más grandes reducirá la deriva. Utilice el mayor volumen de rociado posible para la aplicación. Si se necesita un mayor volumen de rociado, considere utilizar una boquilla con un caudal más alto.
- Presión: Utilice la presión de rociado más baja recomendada para la boquilla con el fin de producir el volumen de aplicación y el tamaño de microgota deseados.
- Boquilla rociadora: Utilice una boquilla rociadora diseñada para la aplicación prevista. Considere utilizar boquillas diseñadas para reducir la deriva.

Cómo controlar el tamaño de las microgotas - Aeronave

- Ajuste las boquillas: Siga las recomendaciones del fabricante de las boquillas al configurarlas. Por lo general, para reducir las microgotas finas, las boquillas deben orientarse en paralelo al flujo de aire en vuelo.

ALTURA DE LA BARRA - Barra rociadora terrestre

En el caso de equipo terrestre, la barra rociadora debe mantenerse a nivel con el cultivo y con un rebote mínimo.

ALTURA DE LIBERACIÓN - Aeronave

Las mayores alturas de liberación aumentan la posibilidad de deriva del rociado.

ROCIADORES CON PANTALLA PROTECTORA

Colocar pantallas protectoras en la barra rociadora o en las boquillas individuales puede reducir la deriva del producto. Considere utilizar rociadores con pantalla protectora. Verifique que las pantallas protectoras no interfieran con el depósito uniforme del rociado sobre el área objetivo.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Al hacer aplicaciones en condiciones atmosféricas calientes y secas, utilice microgotas más grandes para reducir los efectos de la evaporación.

INVERSIONES TÉRMICAS

El potencial de deriva es alto durante las inversiones térmicas. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura con la altitud y son comunes en las noches con nubosidad limitada y poco o nada de viento. La presencia de una inversión puede manifestarse en forma de niebla sobre el suelo o por el movimiento de humo desde una fuente terrestre o de un generador de humo de una aeronave. El humo que se acumula y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (bajo condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que sube y se disipa rápidamente indica una buena mezcla de aire vertical. Evite las aplicaciones durante inversiones térmicas.

VIENTO

Por lo general, el potencial de deriva aumenta con la velocidad del viento. EVITE LAS APLICACIONES DURANTE CONDICIONES CON RÁFAGAS DE VIENTO.

Los aplicadores deben familiarizarse con los patrones de viento locales y el terreno que podrían afectar la deriva del rociado.

Aplicaciones terrestres sin barra rociadora:

Fijar las boquillas a la mínima altura eficaz ayudará a reducir el potencial de deriva del producto.

Aplicaciones con tecnología portátil:

- Tome precauciones para minimizar la deriva del rociado.

MEZCLAS EN TANQUE

NOTIFICACIÓN: La mezcla en tanque o el uso de este producto con cualquier otro producto que no se haya especificado ni esté expresamente autorizado por la etiqueta será a riesgo exclusivo del usuario, aplicador o asesor de aplicación, en la medida en que lo permita la legislación aplicable.

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y cumpla las restricciones y limitaciones correspondientes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos incluidos en la mezcla en tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

IRRIGACIÓN QUÍMICA (para uso en maíz solamente) *

*No apto para usarse en California

Zara SC solo o combinado con otros productos registrados para su aplicación con sistemas de riego por aspersión, puede aplicarse mediante sistemas de riego. Aplique este producto solamente mediante microrriego (microtubos individuales), riego por goteo, riego por aspersión elevado o equipo de riego motorizado calibrado. No lo aplique mediante ningún otro tipo de sistema de riego. Una distribución no uniforme del agua tratada puede causar ineficacia en la aplicación. Si tiene cualquier pregunta sobre la calibración, comuníquese con un especialista del servicio de extensión agrícola estatal, el fabricante del equipo u otros expertos. Una persona que conozca el sistema de irrigación química y sea responsable de su funcionamiento, o que actúe bajo la supervisión de la persona responsable, debe apagar el sistema y hacer los ajustes correspondientes, si es necesario.

Uso de sistemas públicos de abastecimiento de agua

- No aplique **Zara SC** mediante ningún sistema de riego conectado físicamente a un sistema público de abastecimiento de agua.

Por sistema público de abastecimiento de agua se entiende un sistema de suministro al público de agua corriente para el consumo humano si dicho sistema tiene al menos 15 conexiones de servicio o sirve regularmente a un promedio de al menos 25 individuos diariamente al menos 60 días al año. **Zara SC** puede aplicarse a través de sistemas de riego alimentados por un sistema público de abastecimiento de agua solamente si el agua proveniente de dicho sistema se descarga en un tanque de reserva antes de la introducción del pesticida. Entre el extremo de salida de la tubería de llenado y el borde superior o de desborde del tanque de reserva debe haber una interrupción física completa (espacio de aire) de al menos dos veces el diámetro interior de la tubería de llenado. Antes de comenzar la irrigación química, asegúrese siempre de que exista el espacio de aire y no haya ninguna obstrucción del desborde del tanque de reserva.

Cualquier sistema de riego que utilice agua suministrada por un sistema público de abastecimiento de agua también debe cumplir los siguientes requisitos:

Instrucciones de funcionamiento para todos los tipos de sistemas de riego especificados

1. El sistema debe calibrarse para aplicar las concentraciones especificadas de manera uniforme. Si tiene cualquier pregunta sobre la calibración, comuníquese con el especialista del servicio de extensión agrícola estatal, el fabricante del equipo u otros expertos en manejo de aguas.
2. El sistema debe contener una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de vacío y un desagüe de baja presión ubicados adecuadamente en la tubería de riego para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo.
3. La tubería de agua del pesticida debe estar provista de una válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el líquido vuelva a la bomba de inyección.
4. La tubería de inyección de pesticidas también debe incluir una válvula de solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de admisión de la bomba de inyección, y debe estar conectada al enclavamiento del sistema para evitar que se extraiga líquido del tanque de abastecimiento cuando el sistema de riego se apague automática o manualmente.
5. El sistema debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección del pesticida cuando se detenga el motor de la bomba de agua.
6. La tubería de riego o la bomba de agua debe incluir un presostato funcional que detenga el motor de la bomba de agua cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que se vea afectada negativamente la distribución del pesticida.
7. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, una bomba de diafragma), diseñada eficazmente y hecha con materiales compatibles con pesticidas y que pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
8. No aplique la mezcla cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área a tratar.

Instrucciones de calibración y aplicación

Aplique **Zara SC** según el programa especificado en las concentraciones/instrucciones específicas para cada cultivo, y no según el programa de riego, a menos que ambos coincidan. En general, ajuste el equipo para aplicar la cantidad mínima de agua por acre. Haga funcionar el sistema al 95 a 100% de la velocidad nominal máxima de trayectoria indicada por el fabricante.

Las siguientes técnicas de calibración y aplicación se proporcionan para referencia del usuario, pero no constituyen una garantía de idoneidad para la aplicación mediante equipos de riego por aspersión. Compruebe con las agencias reguladoras estatales y locales las posibles restricciones de uso antes de aplicar cualquier producto agroquímico mediante equipo de riego por aspersión.

Equipo de riego de pivote central

1. Utilice solamente sistemas de impulso que provean una distribución uniforme del agua.
2. No utilice cañones terminales al realizar irrigación química con **Zara SC** mediante sistemas de pivote central debido a resultados no uniformes en la aplicación.
3. Tape la primera boquilla más cercana al cabezal de pozo a fin de proteger la fuente de agua.
4. Determine el tamaño del área a tratar.
5. Determine el tiempo necesario para aplicar de 0.10 a 0.15 pulgadas (2.54 a 3.81 mm) de agua sobre la zona a tratar cuando el sistema y el equipo de inyección funcionan a las presiones normales recomendadas por su fabricante. Haga funcionar el sistema al 95 a 100% de la velocidad nominal máxima de trayectoria indicada por el fabricante.
6. Determine el rendimiento de la bomba de inyección, utilizando agua solamente, cuando funciona a la presión normal de la tubería.
7. Determine la cantidad de **Zara SC** (y de cualquier adyuvante de mezcla en tanque) necesaria para tratar el área cubierta por el sistema de riego.
8. Añada la cantidad necesaria de **Zara SC** (y de cualquier adyuvante de mezcla en tanque) y suficiente agua para cumplir los requisitos de tiempo de inyección a los tanques de solución. (Consulte la sección "Instrucciones de mezclado" de esta etiqueta).
9. Asegúrese de que el sistema esté completamente cargado con agua antes de comenzar a inyectar la solución de **Zara SC**. Programe la inyección para que dure, al menos, el tiempo necesario para llevar el sistema a la presión máxima.
10. Mantenga una agitación constante en el tanque de la solución durante el período de inyección.
11. Inyecte la cantidad especificada de **Zara SC** por acre de forma continua durante un ciclo completo del sistema.
12. Cuando haya terminado el tratamiento, detenga el sistema de inyección. Mantenga el sistema en funcionamiento hasta que la solución de **Zara SC** haya salido de las cabezas de los aspersores.
13. Espere hasta que todas las tuberías purguen el pesticida por todas las boquillas antes de cerrar el agua de riego.

Sistema de riego de aspersores fijos, portátiles (manuales) y móviles sobre ruedas

1. Determine la superficie cubierta por los aspersores.
2. Llene con agua el tanque de solución del inyector y calibre el caudal del sistema para que se vacíe el contenido del depósito en un intervalo de tiempo de entre 30 y 50 minutos al final del ciclo de riego.
3. Determine la cantidad de **Zara SC** necesaria para tratar el área cubierta por el sistema de riego.
4. Añada la cantidad necesaria de **Zara SC** (y de cualquier otro adyuvante de mezcla en tanque) en la misma cantidad de agua utilizada para calibrar el período de inyección. (Consulte la sección "Instrucciones de mezclado" de esta etiqueta).
5. Haga que el sistema funcione a la misma presión e intervalo de tiempo establecidos durante la calibración.
6. Inyecte la cantidad especificada de **Zara SC** por acre durante un período de 30 a 50 minutos, ya sea al final de un ciclo de riego regular o como una inyección separada de 30 a 50 minutos no asociada a un riego regular, a fin de maximizar la retención del insecticida por parte del follaje.
7. Cuando haya terminado el tratamiento, detenga el sistema de inyección. Mantenga el sistema en funcionamiento hasta que la solución de **Zara SC** haya salido de la cabeza del último aspersor. Para asegurarse de que las tuberías estén limpias y libres de pesticida remanente, se puede inyectar un colorante indicador en las tuberías a fin de marcar el final del período de aplicación.

ZARZA (Subgrupo 13-07A)				
Zarzamora, baya loganberry, frambuesa roja y negra, frambuesa silvestre y cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas.				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela roja europea Arañuela de McDaniel Arañuela de dos puntos Arañuela amarilla	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	0
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto por vía terrestre como rociado de cobertura total en un mínimo de 50 galones/acre de agua. Las aplicaciones de Zara SC deben realizarse utilizando suficiente portador (agua) para garantizar una cobertura completa de las partes vegetativas y reproductivas del cultivo que los ácaros utilizan para dispersarse, alimentarse y reproducirse. Utilice mayores volúmenes de agua en árboles más viejos y en variedades que tengan un follaje más compacto y denso. Un mayor volumen de agua, junto con un equipo bien calibrado, ayudará a proporcionar una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

MAÍZ DE CAMPO, MAÍZ PALOMERO Y MAÍZ (para la producción de semillas)				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela del maíz ¹ Arañuela carmín Arañuela del Pacífico Arañuela de la fresa Arañuela de dos puntos	2.0 a 6.0 (0.045 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	2	21
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 3 galones/acre por vía aérea o un mínimo de 10 galones/acre por vía terrestre). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Se recomienda aplicar Zara SC antes de la etapa de desarrollo de la panoja para permitir una buena cobertura y proporcionar un mejor control. Para el maíz de campo utilizado para la producción de semillas, aplique Zara SC antes o en la etapa de desarrollo de la panoja. Si es necesario realizar una segunda aplicación, espere 14 días para volver a tratar con Zara SC . Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros estén por debajo del umbral o comiencen a acumularse en las plantas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Acate siempre el umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. En la sección sobre irrigación química encontrará información sobre las aplicaciones que utilizan este tipo de irrigación. Restricciones - No aplique más de 0.27 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 2.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. - No aplique tratamientos con un intervalo menor de 14 días entre sí. - No realice aplicaciones aéreas en Nueva York.				

¹ Las aplicaciones dirigidas exclusivamente a la arañuela del maíz pueden requerir concentraciones más altas, particularmente si las poblaciones han excedido el umbral establecido en los campos a tratar con **Zara SC**. Además, ante condiciones de sequía extrema y poblaciones más altas, las arañuelas del maíz podrían requerir más de una aplicación de un acaricida.

MAÍZ DULCE*				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela del maíz Arañuela carmín Arañuela del Pacífico Arañuela Arañuela de la fresa Arañuela de dos puntos	2.0 a 6.0 (0.045 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	21
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 3 galones/acre por vía aérea o un mínimo de 10 galones/acre por vía terrestre). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique Zara SC antes de la etapa de desarrollo de la panoja para permitir una buena penetración del rociado y proporcionar un mejor control en todo el dosel de la planta. Se obtienen mejores resultados cuando las poblaciones de ácaros se tratan antes de o en los umbrales establecidos. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Acate siempre el umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Seleccione la concentración más baja para las infestaciones leves, y use la concentración más alta para las infestaciones más intensas. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 2.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. - No realice aplicaciones aéreas en Nueva York. *No apto para usarse en California				

ALGODÓN (incluidos [Subgrupo 20C] semillas de algodón: cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas).				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela carmín Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos	1.33 a 2.0 (0.03 a 0.045 lb de i.a./acre)	2.0 (0.045 lb de i.a./acre)	1	28
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (de 3 a 10 galones/acre por vía aérea o de 10 a 50 galones/acre por vía terrestre). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.09 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 1.33 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

HORTALIZAS CUCURBITÁCEAS				
Calabaza bellota, balsamina, cundeamor chino, melón amargo, tamalayote, calabaza, cantalupo, chayote (fruta), pepino chino, esponja vegetal, calabaza china (calabaza de la cera), melón cidra, pepino, cucuzza, pepinillo de las indias, calabaza comestible, hechima, calabaza Hubbard, hyotan, <i>Momordica</i> spp., melón común, calabacín, calabaza amarilla, calabacín de verano, sandía, calabacín de invierno				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela de dos puntos Arañuela carmín Arañuela del Pacífico Arañuela de la fresa	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	7
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 3 galones/acre por vía aérea o un mínimo de 10 galones/acre por vía terrestre). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Las aplicaciones de Zara SC deben realizarse utilizando suficiente portador (agua) para garantizar una cobertura completa de las partes vegetativas y reproductivas del cultivo que los ácaros utilizan para dispersarse, alimentarse y reproducirse. Utilice mayores volúmenes de agua en plantas más maduras y en variedades que tengan un follaje más compacto y denso. Un mayor volumen de agua, junto con un equipo bien calibrado, ayudará a proporcionar una mejor cobertura. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. - No realice aplicaciones aéreas en Nueva York.				

LÚPULOS				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela de dos puntos	6.0 a 8.0 (0.135 a 0.18 lb de i.a./acre)	8.0 (0.18 lb de i.a./acre)	1	7
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo terrestre en un mínimo de 50 galones/acre de agua. La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.18 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 6.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

BAYAS DE CRECIMIENTO BAJO (Subgrupo 13-076)				
Uva de oso, arándano europeo, arándano azul, arándano silvestre, zarzamora de los pantanos, arándano rojo, arándano de montaña, arándano australiano, axocopaque o gaulteria, fresas y cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas.				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro rojo europeo Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	1
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo terrestre en un mínimo de 100 galones/acre de agua. La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Zara SC no controlará el ácaro ciclamino. Si estos ácaros son un problema, se debe utilizar otro acaricida registrado para esta plaga. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

INSTRUCCIONES DE MEZCLA EN TANQUE PARA BAYAS DE CRECIMIENTO BAJO (Subgrupo 13-076)				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre) + Insecticida que contiene fenpropatrina	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	1
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y cumpla las restricciones y limitaciones correspondientes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos incluidos en la mezcla en tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque. Aplique el producto con equipo terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 100 galones/acre). Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. Altere con otros insecticidas no piretroides si es necesario repetir el tratamiento en menos de 30 días para cumplir con los programas locales de manejo integrado de plagas. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas.				

MENTA (menta piperita y hierbabuena)				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela del Pacífico Arañuela de la fresa Arañuela de dos puntos	4.0 a 8.0 (0.09 a 0.18 lb de i.a./acre)	8.0 (0.18 lb de i.a./acre)	1	7
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 10 galones/acre por vía aérea o 50 galones/acre por vía terrestre). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.18 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. - No realice aplicaciones aéreas en Nueva York.				

PIMIENTOS Y BERENJENAS (Subgrupo 8-10B)				
Berenjena africana, pimiento morrón, berenjena, uña de gato, pimiento no morrón, oca o quimbombó, berenjenita o hierba sosa, pepino, rosella o rosa de Jamaica, nakatí o berenjena escarlata, cultivares y/o variedades e híbridos de estos productos agrícolas.				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	7
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo terrestre en un mínimo de 20 galones/acre de agua. Las aplicaciones de Zara SC deben realizarse utilizando suficiente portador (agua) para garantizar una cobertura completa de las partes vegetativas y reproductivas del cultivo que los ácaros utilizan para dispersarse, alimentarse y reproducirse. Utilice mayores volúmenes de agua en plantas más maduras y en variedades que tengan un follaje más compacto y denso. Un mayor volumen de agua, junto con un equipo bien calibrado, ayudará a proporcionar una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

FRUTAS POMÁCEAS (Grupo agrícola 11-10)				
Manzana; acerola*; manzano silvestre; nispero japonés; crataegus; nispero europeo*; pera; pera, asiática; membrillo; membrillo, chino*; membrillo, japonés*; tejocote*; cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas*.				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro rojo europeo Arañuela de McDaniel Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	14
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto por vía terrestre con equipo de aspersión neumático en un mínimo de 100 galones/acre. La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Zara SC no controlará los ácaros de la roya ni los ácaros de ampolla. Si estas plagas son un problema, utilice un acaricida alternativo registrado para ese uso. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. *No apto para usarse en California				

FRUTAS PEQUEÑAS DE ENREDADERAS, EXCEPTO KIWI PELUDO (Subgrupo 13-07F)				
Uva del río Amur, grosella espinosa europea, uva, kiwiño, pasiflora, baya de schisandra, cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas.				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro rojo europeo Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos Ácaro Williamette	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	14
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto por vía terrestre como rociado de cobertura total en un mínimo de 25 galones/acre de agua. La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Zara SC no controlará los ácaros de la roya ni los ácaros de ampolla. Si estas plagas son un problema, utilice un acaricida alternativo registrado para ese uso. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

SOYA			
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada
Arañuela de dos puntos y cualquier otra especie perteneciente a la familia de las arañas (Tetranychidae)	2.0 a 6.0 (0.045 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1
INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 3 galones/acre por vía aérea o un mínimo de 10 galones/acre por vía terrestre). La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. El uso de mayores volúmenes de agua garantiza una mejor cobertura. Se recomienda aplicar Zara SC antes de que las poblaciones de ácaros hayan sobrepasado los umbrales establecidos. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros comiencen a acumularse en las plantas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida y debe usarse al comienzo del ciclo de vida de los ácaros. Acate siempre el umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No lo aplique después de la etapa de crecimiento R5. - No haga pastar al ganado en campos de soya tratados ni lo alimente con el forraje o heno tratado. - No utilice concentraciones inferiores a 2.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. - No realice aplicaciones aéreas en Nueva York.			

FRUTAS CON HUESO (Grupo agrícola 12-12)				
Albaricoque; albaricoque japonés*; capulín*; cerezo negro*; cerezo de Nankín*; cerezo (dulce y ácido); jinjolero (dátil rojo); nectarino; duraznero; ciruelo; ciruelo rojo americano*; ciruelo de playa*; ciruelo canadiense*; ciruelo-cerezo* (ciruelo mirabolano o de jardín); ciruelo chickasaw; ciruelo silvestre Damson; ciruelo japonés; ciruelo klamath*; ciruelo europeo; ciruelo para deshidratar; ciruelo plumcot; arañón o endrino*; y cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas.*				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro rojo europeo Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	7
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo terrestre en un mínimo de 50 galones/acre de agua. La cobertura es esencial para lograr un control eficaz. Si se utiliza un mayor volumen de agua se obtendrá una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.27 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. *No apto para usarse en California				

Raíces y hojas de la remolacha azucarera*				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Arañuela carmín Arañuela roja europea Arañuela de McDaniel Arañuela del Pacífico Arañuela de la fresa Arañuela de dos puntos Arañuela amarilla	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	30
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para obtener una cobertura uniforme (un mínimo de 3 galones/acre por vía aérea o un mínimo de 20 galones/acre por vía terrestre). Las aplicaciones de Zara SC deben realizarse utilizando suficiente portador (agua) para garantizar una cobertura completa de las partes vegetativas y reproductivas del cultivo que los ácaros utilizan para dispersarse, alimentarse y reproducirse. Utilice mayores volúmenes de agua en las remolachas azucareras cuyo follaje haya alcanzado un desarrollo avanzado (cierre de las hileras). Un mayor volumen de agua, junto con un equipo bien calibrado, ayudará a proporcionar una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Seleccione la concentración más baja para las infestaciones leves, y use la concentración más alta para las infestaciones más intensas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre de Zara SC por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. - No lo utilice en remolachas azucareras cultivadas para semilla. *No apto para usarse en California				

FRUTOS SECOS (Grupo agrícola 14-12)				
Nogal africano*; almendro; hayuco; nuez de Brasil; nogal blanco brasileño*; pino bunya*; roble bur*; nogal blanco americano; nuez de cajou*; árbol candil*; castaña de cajú; castaña; chincapín; coco*; coquitos*; mango africano*; ginkgo*; zapote de agua*; avellano (Filbert); nogal japonés*; caria; falso castaño japonés*; nuez de macadamia; nuez de mongongo*; coco de mono*; avellano común*; nuez okari*; malparia pachira*; nuez de chontaduro*; pecana*; pequí*; nuez de pili*; pino piñonero*; pistacho; sapucaia*; almendro malabar*; nuez común oscura; nuez común inglesa; castaño de flor chino*; cultivares, variedades y/o híbridos de estos productos agrícolas*.				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro rojo europeo Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos Ácaro de la hoja del pecán* (<i>Eotetranychus hicoriae</i>)	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	28
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto por vía terrestre con equipo de aspersión neumático como rociado de cobertura total. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. *No apto para usarse en California				

ÁRBOLES FRUTALES NO PRODUCTIVOS				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro rojo europeo Arañuela de McDaniel Arañuela del Pacífico Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	Un año
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto por vía terrestre con equipo de aspersión neumático como rociado de cobertura total. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones - No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. - No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros.				

FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES (PIEL NO COMESTIBLE)				
Aguacate; zapote amarillo; mango; papaya; chicozapote; zapote; zapote negro; zapote mamey; caimito				
Plagas	Concentración de producto fl oz/acre	Concentración máxima por aplicación fl oz/acre	Aplicaciones máximas por temporada	Intervalo de precosecha** Días
Ácaro café del aguacate Ácaro del aguacate Arañuela de dos puntos	4.0 a 6.0 (0.090 a 0.135 lb de i.a./acre)	6.0 (0.135 lb de i.a./acre)	1	1
**Intervalo de precosecha INSTRUCCIONES DE USO Aplique el producto con equipo aéreo o terrestre en una cantidad de agua adecuada para una cobertura uniforme (un mínimo de 20 galones/acre por vía aérea o un mínimo de 50 galones/acre por vía terrestre). Las aplicaciones de Zara SC deben realizarse utilizando suficiente portador (agua) para garantizar una cobertura completa de las partes vegetativas y reproductivas del cultivo que los ácaros utilizan para dispersarse, alimentarse y reproducirse. Utilice mayores volúmenes de agua en plantas más maduras y en variedades que tengan un follaje más compacto y denso. Un mayor volumen de agua, junto con un equipo bien calibrado, ayudará a proporcionar una mejor cobertura. Aplique el tratamiento cuando las poblaciones de ácaros sean bajas. Zara SC es predominantemente un ovicida/larvicida. Aplique Zara SC en o antes del umbral establecido para su zona, sin exceder la concentración máxima anual. Utilice concentraciones más altas para infestaciones moderadas a intensas, especialmente en el caso de plantas con dosel denso, y use concentraciones más bajas para infestaciones leves. En la sección MANEJO DE LA RESISTENCIA encontrará recomendaciones para retardar la resistencia de los ácaros tanto a Zara SC como a otros acaricidas. Restricciones ▪ No aplique más de 0.135 lb de i.a./acre por año natural. ▪ No utilice concentraciones inferiores a 4.0 fl oz/acre ya que puede resultar en un control deficiente y contribuir al desarrollo de resistencia al etoxazol entre las poblaciones de ácaros. ▪ No realice aplicaciones aéreas en Nueva York.				

MODELO

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacene el producto en un recipiente herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco.

DESECHO DE PESTICIDAS: La mezcla de aplicación del pesticida o el agua resultante del enjuague del equipo que no se pueda usar debe desecharse en un área para desechos sanitarios aprobada para pesticidas. La eliminación inadecuada de pesticida sobrante, mezclas de aplicación o aguas de enjuague o lavado de envases constituye una violación de la Ley Federal (EE. UU.). Si estos residuos no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, contacte a la agencia para el manejo de pesticidas o control ambiental de su estado, o al representante para el Manejo de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener indicaciones del proceso a seguir para su eliminación.

MANEJO DEL RECIPIENTE

Para recipientes de plástico de ≤ 5 galones (19 L): Recipiente no rellenable: No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces (o equivalente) el recipiente inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Llene el recipiente ¼ con agua y tape de nuevo. Agite por 10 segundos. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca el recipiente para su reciclaje, perfórelo y deséchelo en un área adecuada para desechos sanitarios.

Para recipientes de plástico de > 5 galones (19 L): Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces (o equivalente) el recipiente inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar. Llene ¼ del recipiente con agua. Tape de nuevo y asegure los cierres. Vuelque el recipiente al lado y hágalo rodar por 30 segundos, asegurando por lo menos una revolución completa. Ponga el recipiente vertical e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Dé vuelta al recipiente hacia el lado opuesto e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca el recipiente para su reciclaje, perfórelo y deséchelo en un área adecuada para desechos sanitarios.

LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR. Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador aceptan la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Podrían ocurrir ineficacia, daños y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores como la forma de uso o aplicación (incluido el uso indebido), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, todo lo cual está fuera del control de ATTICUS, LLC. El comprador o usuario asumirán todos esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, aparte de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC, el fabricante y el vendedor no serán responsables de daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso, el manejo, la aplicación, el almacenamiento o la eliminación de este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, el manejo, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

Zara™ es marca comercial de Atticus, LLC.

Zeal® SC Miticide es marca registrada de Valent U.S.A. Corporation.

20220203a

MODELO