



Contiene flutriafol, el ingrediente activo utilizado en el fungicida TopGuard®.

Para usar en uvas (frescas, para jugo, de mesa, para vino, pasas), lúpulos, frutas pomáceas (manzano, manzano silvestre, níspero japonés, majuelo (espino blanco), peral, peral oriental, membrillo) y frutas con hueso.

**INGREDIENTE ACTIVO:**

\*Flutriafol ..... 11.8%

**OTROS INGREDIENTES:** ..... 88.2%

**TOTAL** ..... 100.0%

\*Contiene 1.04 libras por galón del ingrediente activo flutriafol.

Concentrado en suspensión.

N.º de reg. de EPA: 91234-385

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS CAUTION/PRECAUCIÓN

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Consulte las declaraciones de precaución adicionales más adelante.

### PRIMEROS AUXILIOS

<b>Si se ingiere:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.</li><li>Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua.</li><li><b>NO</b> induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamientos o el médico.</li><li><b>NO</b> administre nada por vía oral a una persona inconsciente.</li></ul>
-----------------------	---

<b>Si entra en contacto con la piel o la ropa:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Quítese la ropa contaminada.</li><li>Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15 a 20 minutos.</li><li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.</li></ul>
--	--

<b>Si entra en contacto con los ojos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos.</li><li>Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.</li><li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.</li></ul>
---	--

### NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar a SafetyCall al 1-844-685-9173 para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.

**NOTA AL MÉDICO:** No hay un antídoto específico. Trate según los síntomas.

**En caso de emergencia química: En caso de derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC, de día o de noche  
Dentro de los EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 o +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)**

Sivora™ SPC no es fabricado ni distribuido por FMC Corporation, vendedor del fungicida TopGuard®.

# **DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN**

## **RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

### **PRECAUCIÓN**

Dañino si se absorbe por la piel. Dañino si se ingiere. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular los pesticidas y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. Quitese y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

### **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**

#### **Los aplicadores y todos los demás manipuladores de pesticidas deben usar:**

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes resistentes a productos químicos hechos de laminados impermeables, goma de butilo, goma de nitrilo, goma de neopreno, cloruro de polivinilo (PVC) o Viton® (de  $\geq$  14 milipulgadas [0.36 mm] de espesor en todos los casos)
- Zapatos y calcetines (medias)
- Lentes o gafas protectoras

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

### **DECLARACIÓN SOBRE CONTROLES DE INGENIERÍA**

Cuando los manipuladores del producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de manera que cumplan con los requisitos establecidos en el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (Worker Protection Standard, WPS) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4-6)], los requisitos en cuanto a equipo de protección personal de estas personas pueden reducirse o modificarse según lo especificado en el WPS.

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO**

#### **Los usuarios deben:**

- Quitarle inmediatamente la ropa/PPE si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia. Lavarse inmediatamente con agua y jabón si el producto entra en contacto con la piel.
- Quitarle inmediatamente el PPE luego de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto sea posible, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.

### **RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE**

Este producto formulado es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. **NO** lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. **NO** contamine cuerpos de agua cuando disponga de las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

**Notificación sobre aguas subterráneas:** El flutriafol tiene propiedades y características asociadas con productos químicos detectados en aguas subterráneas. Este producto químico se puede filtrar a aguas subterráneas si es utilizado en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie.

**Notificación sobre aguas superficiales:** Este producto puede impactar la calidad de cuerpos de agua superficiales debido a escorrentías de aguas pluviales. Esto es

especialmente notable en suelos con poco drenaje y suelos con una tabla de agua que está cercana a la superficie. Este producto se clasifica con alto potencial de llegar al agua superficial mediante la escorrentía por varios meses o más después de su aplicación.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Es una violación de la ley federal (EE.UU.) utilizar este producto de cualquier manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta. **NO** aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Sólo se permite la presencia de los manipuladores del producto con protección adecuada en el área durante su aplicación. Si desea obtener información acerca de los requisitos específicos para su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

**No apto para su venta, distribución ni uso en los condados de Nassau y Suffolk del estado de Nueva York.**

### **REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA**

Utilice este producto sólo de acuerdo con su etiqueta y el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS, por sus siglas en inglés), 40 CFR Parte 170. Dicho estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en emergencias. También contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal (PPE) y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos en esta sección de la etiqueta aplican únicamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS).

**NO** ingrese ni permita la entrada de trabajadores a las áreas tratadas durante el intervalo de acceso restringido (REI, por sus siglas en inglés). El REI para cada cultivo se indica en las instrucciones de uso de cada cultivo.

El PPE requerido para el acceso anticipado a áreas tratadas de acuerdo con el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola, y que involucra el contacto con cualquier elemento que se haya tratado, como plantas, tierra o agua, es:

- Overol (mameluco)
- Guantes resistentes a productos químicos
- Zapatos y calcetines (medias)

### **INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO**

**LEA TODA LA ETIQUETA. UTILICE EL PRODUCTO CUMPLIENDO ESTRICAMENTE LAS DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN, LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LOS REGLAMENTOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES.**

No apto para usarse en invernaderos.

### **IRRIGACIÓN QUÍMICA**

#### **Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química)**

Aplique **Sivora SPC** mediante riego a los cultivos según las concentraciones y momentos de aplicación que figuran en esta etiqueta. El tanque de productos químicos y el sistema de inyección deben limpiarse a fondo antes y después de cada uso. Enjuague el sistema con agua limpia.

#### **Riego por goteo:**

Aplique **Sivora SPC** para el control de enfermedades utilizando las concentraciones y momentos de aplicación especificados en esta etiqueta. Asegúrese de que el suelo

tenga la humedad adecuada antes de utilizar **Sivora SPC** en un sistema de riego por goteo. **NO** aplique **Sivora SPC** mediante un sistema de riego por goteo que se encuentre a más de 12" (30 cm) por debajo de la superficie del suelo.

Interrumpa el riego por goteo al agotarse el fungicida del tanque de abastecimiento principal o 6 horas después del inicio, lo que sea más breve. Para obtener mejores resultados, postergue la irrigación posterior (sólo con agua) durante al menos 24 horas después de la aplicación por goteo.

#### Riego con aspersor:

Aplique este producto mediante sistemas aspersores tales como sistemas de riego de pivote central, de movimiento lateral, de remolque terminal, de rodaje lateral (rueda), propulsados, con pistola de presión, fijos, de microaspersión o portátiles (manuales). **NO** aplique este producto mediante ningún otro tipo de sistema de riego, excepto según lo especificado en esta etiqueta.

Utilice equipo de riego de pivote central para aplicar **Sivora SPC** solamente mediante equipos con sistemas de propulsión que provean una distribución uniforme del agua. **NO** utilice cañones terminales para la irrigación química debido a los patrones no uniformes de aplicación.

Agregue **Sivora SPC** al tanque de abastecimiento de pesticidas con un volumen de agua suficiente para mantener un flujo continuo a través del equipo de inyección. Mantenga la agitación durante todo el período de aplicación.

Para los sistemas de riego de movimiento continuo, aplique la concentración especificada en la etiqueta para ese cultivo en 1/2 acre-pulgada o menos por acre. Para sistemas de riego fijos o de movimiento no continuo, inyecte la mezcla de rociado de **Sivora SPC** durante los últimos 20 a 30 minutos del ciclo de riego.

**NO** lo aplique cuando la velocidad del viento supere las 10 a 15 millas/hora (16 a 24 km/h) para evitar la deriva o saltos causados por el viento. **NO** lo aplique cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área a tratar. La distribución no uniforme del agua tratada podría causar daños en los cultivos, aplicación ineficaz o residuos de pesticidas ilegales en la cosecha. Para lograr un buen control se requiere realizar una cobertura completa del follaje.

Si tiene preguntas sobre la calibración, debe comunicarse con un especialista del servicio de extensión agrícola estatal, el fabricante del equipo u otros expertos.

#### Requisitos de operación para aplicación mediante sistemas de riego:

1. **NO** use irrigación química cuando las condiciones favorezcan la deriva hacia áreas no objetivo.
2. Para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo, debe haber una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de vacío y un desagüe de baja presión en la tubería de riego.
3. Para evitar que el líquido vuelva a la bomba de inyección, la tubería de inyección de pesticidas debe estar provista de una válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido.
4. Para evitar que se extraiga líquido del tanque de abastecimiento de productos químicos cuando el sistema de riego se apague, la tubería de inyección de pesticidas también debe estar equipada con una válvula de solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de admisión de la bomba de inyección, y debe estar conectada al enclavamiento del sistema.
5. El sistema también debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detenga el motor de la bomba de agua y estar provisto de un presostato funcional para detener el motor de la bomba cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que se vea afectada negativamente la distribución del pesticida.

6. El sistema debe estar provisto de una bomba dosificadora, construida con materiales compatibles con los pesticidas y capaz de equiparse con un enclavamiento de sistema, incluyendo una bomba de inyección de desplazamiento positivo (p. ej., una bomba de diafragma).

7. Una persona que conozca el sistema de irrigación química y que sea responsable de su funcionamiento debe apagar el sistema y cerrar el agua de riego, proporcionando suficiente tiempo para que el pesticida se descargue por todas las tuberías y boquillas.

8. Se prohíbe conectar cualquier sistema de riego (incluidos los de invernaderos) a una red pública de abastecimiento de agua para aplicar pesticidas, a menos que se hayan implementado las medidas y dispositivos de seguridad indicados en la etiqueta del pesticida para dicha conexión.

#### Instrucciones específicas para sistemas públicos de abastecimiento de agua:

1. Por sistema público de abastecimiento de agua se entiende un sistema que suministra agua corriente para el consumo humano si dicho sistema tiene al menos 15 conexiones de servicio o surte regularmente a un promedio de al menos 25 personas diariamente por al menos 60 días al año.

2. Todos los procedimientos y los dispositivos que se indican en la sección **Requisitos de operación para aplicación mediante sistemas de riego** deben estar operativos para conectarse a un sistema público de abastecimiento de agua.

3. Adicionalmente, los sistemas de irrigación química conectados a los sistemas públicos de abastecimiento de agua deben contener una zona de presión reducida funcional, un dispositivo antirretorno o su equivalente funcional en la tubería de abastecimiento de agua corriente arriba del punto de inyección del pesticida. Como alternativa a la zona de presión reducida, el agua de sistemas públicos de abastecimiento debe descargarse en un depósito de reserva antes de la inyección del pesticida. Entre el extremo de salida de la tubería de llenado y el borde superior o de desborde del tanque de reserva debe haber una interrupción física completa (espacio de aire) de al menos dos veces el diámetro interior de la tubería de llenado.

**Resistencia a la lluvia:** **Sivora SPC** puede resistir la lluvia 2 horas después de su aplicación. El control de la enfermedad disminuirá si llueve antes de que transcurran estas 2 horas.

## ROTACIÓN DE CULTIVOS

En los campos tratados con **Sivora SPC** se pueden plantar los siguientes cultivos y respetar los siguientes intervalos de resiembra:

Cultivo	Intervalo de resiembra
Alfalfa; cebada; maíz de campo; maíz de campo cultivado para semilla; maíz palomero; maíz dulce; algodón; cucurbitáceas; hortalizas de fruto; uvas; lúpulos; hortalizas de hoja del género brassica, Grupo agrícola 5; hortalizas de hoja (excepto brassica), Grupo agrícola 4; cacahuate; frutas pomáceas; sorgo granífero; soya; frutas con hueso; fresa; remolacha azucarera; tomate; frutos secos; triticale o trigo	Inmediatamente
Arroz	30 días
Todos los demás cultivos	Prohibido

## TABLA DE EQUIVALENCIA DE CONCENTRACIONES

Concentración de producto (Fl oz/acre)	Concentración de ingrediente activo equivalente (Lb de i.a./acre)
7	0.057
8	0.065
10	0.081
12	0.098
13	0.106
14	0.114
16	0.130
24	0.20
30	0.24
32	0.26
48	0.39

### PRUEBA DE COMPATIBILIDAD EN FRASCO

**Sivora SPC** es compatible con la mayoría de los productos; no obstante, no se han probado todas las combinaciones. Utilice la siguiente prueba en frasco para asegurar la compatibilidad física.

Utilice un frasco con capacidad para un cuarto de galón (0.95 L) y agregue las cantidades proporcionales de los productos a aproximadamente un cuarto de galón de agua, manteniendo la agitación. Añada primero los polvos humedecibles (solubles) y los productos granulares dispersables en agua, luego los líquidos con capacidad de fluir, los concentrados emulsionables y, por último, los productos solubles en líquidos. Despues de mezclar completamente, deje reposar la mezcla por 5 minutos. Si la combinación permanece mezclada o puede volver a mezclarse fácilmente, es físicamente compatible. Una vez comprobada la compatibilidad, utilice el mismo procedimiento para agregar productos al tanque de rociado. Utilice combinaciones de mezclas en tanque en una pequeña cantidad de plantas antes de tratar áreas más grandes. Al mezclar en tanque, siga las instrucciones más restrictivas para todos los adyuvantes de mezcla en tanque. **NO** lo mezcle en tanque con ningún producto cuya etiqueta prohíba dicha mezcla.

### USO DE COADYUVANTES

Se puede usar un coadyuvante con **Sivora SPC**, a menos que se especifique otra cosa en las instrucciones de uso del cultivo. **Sivora SPC** es compatible con la mayoría de los productos; sin embargo, no todos se han probado. Haga una prueba en frasco para asegurar la compatibilidad física.

### MEZCLADO EN TANQUE

**Sivora SPC** puede mezclarse en tanque con otros fungicidas, herbicidas, insecticidas y/u otros aditivos, a menos que se prohíba en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Siga las instrucciones más restrictivas para todos los adyuvantes de mezcla en tanque. Aunque **Sivora SPC** es compatible con la mayoría de los productos, no se han probado todas las combinaciones. Haga una prueba en frasco para asegurar la compatibilidad física. Antes de aplicar cualquier mezcla en tanque no especificada en esta etiqueta, verifique la seguridad del cultivo objetivo aplicando la mezcla a una pequeña zona del cultivo en cuestión según las instrucciones de la etiqueta. Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y cumpla las restricciones y limitaciones

correspondientes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos incluidos en la mezcla en tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

### EQUIPO/VOLUMEN DE ROCIADO

Aplique **Sivora SPC** en suficiente volumen de agua para asegurar una cobertura completa mediante una aplicación foliar al voleo para lograr un buen control de la enfermedad.

Para aplicaciones terrestres, use como mínimo 10 galones (38 L) de solución de rociado por acre mediante equipo terrestre. Para aplicaciones aéreas, use equipo de rociado de aeronave en un mínimo de 5 galones (19 L) de solución de rociado por acre.

**Alta presión de la enfermedad:** Cuando se indique un rango de dosis, use la concentración más alta especificada de **Sivora SPC** y/o reduzca el intervalo de aplicación cuando haya una presión intensa de la enfermedad y/o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

### MANEJO DE LA RESISTENCIA

Para el manejo de la resistencia, **Sivora SPC** contiene un fungicida del Grupo 3 (flutriafol).

Cualquier población de hongos puede contener individuos naturalmente resistentes a **Sivora SPC** y a otros fungicidas del Grupo 3. Con el tiempo puede producirse una pérdida gradual o total del control de la plaga si dichos fungicidas se utilizan repetidamente en los mismos campos. Deben seguirse las estrategias apropiadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia al fungicida, realice uno o más de los siguientes pasos:

- Rote la aplicación de **Sivora SPC** u otros fungicidas del Grupo 3 dentro de una secuencia de temporada de cultivo con diferentes grupos que controlan los mismos patógenos. Use mezclas en tanque con fungicidas de un grupo diferente que sean igualmente eficaces en la plaga objetivo cuando se permita dicho uso. Utilice al menos la concentración mínima de aplicación indicada por el fabricante.
- Adopte un programa de manejo integrado de enfermedades para el uso de fungicidas que incluya exploración, que utilice la información histórica relacionada con el uso de pesticidas y la rotación de cultivos, y que considere la resistencia de la planta huésped, el impacto de las condiciones ambientales en el desarrollo de enfermedades, los umbrales de las enfermedades, así como prácticas de control de cultivo, biológicas y otras prácticas de control químico.
- Donde sea posible, utilice modelos de predicción de enfermedades para programar eficazmente las aplicaciones de fungicidas. Tenga presente que el uso de modelos de predicción por sí solo no es suficiente para controlar la resistencia.
- Monitoree el desarrollo de resistencia en las poblaciones de hongos tratadas.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local o asesor certificado en cultivos para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de resistencia a los pesticidas o el manejo integrado de plagas para los cultivos y patógenos específicos.
- Para obtener información sobre el manejo de la resistencia o para reportar una presunta resistencia, comuníquese con su distribuidor de pesticidas o con un especialista universitario en extensión agrícola.

## INSTRUCCIONES DE USO EN CULTIVOS

### UVAS

(frescas, para jugo, de mesa, para vino, pasas)

Enfermedades	Concentración de producto (Fl oz/acre)	Instrucciones de aplicación	Intervalo de aplicación (Días)
Mildiú (moho) polvoroso <i>(Uncinula necator)</i>	8 - 10 (0.065 - 0.081 lb de i.a.)	Aplique <b>Sivora SPC</b> como aspersión foliar cuando los brotes tengan de 6 a 10 pulgadas (15 a 25 cm).	14 a 21
Podredumbre negra <i>(Guignardia bidwellii)</i>	8 - 10 (0.065 - 0.081 lb de i.a.)	Aplique preventivamente o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repita según sea necesario si las condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad.	

**Restricciones:**

- Ninguna aplicación individual puede exceder 10 fl oz (0.081 lb de i.a.) de producto por acre.
- **Intervalo mínimo entre aplicaciones (RTI):** 14 días.
- **NO** realice más de 6 aplicaciones de producto por año.
- **NO** aplique más de 60 fl oz (0.488 lb de i.a.) de producto por acre al año.
- **NO** aplique más de 0.488 lb de i.a. de flutriafol por acre al año.
- **Intervalo de acceso restringido (REI):**
  - **REI para el anillado o el volteo de racimos en uvas:** 5 días.
  - El REI para todas las demás actividades es de 12 horas.
- **Intervalo de precosecha (PHI): NO** lo aplique durante los 14 días previos a la cosecha.

### LÚPULOS

Enfermedades	Concentración de producto (Fl oz/acre)	Instrucciones de aplicación	Intervalo de aplicación (Días)
Mildiú (moho) polvoroso <i>(Podosphaera macularis,</i> <i>Sphaerotheca macularis)</i>	10 - 14 (0.081 - 0.114 lb de i.a.)	Aplique preventivamente o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repita según sea necesario si las condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad. Utilice un volumen de rociado mínimo de 30 galones (113 L) por acre para aplicaciones terrestres y de 10 galones (38 L) por acre para aplicaciones aéreas.	14

**Restricciones:**

- Ninguna aplicación individual puede exceder 14 fl oz (0.114 lb de i.a.) de producto por acre.
- **Intervalo mínimo entre aplicaciones (RTI):** 14 días.
- **NO** haga más de 4 aplicaciones por año.
- **NO** aplique más de 56 fl oz (0.455 lb de i.a.) de producto por acre al año.
- **NO** aplique más de 0.455 lb de i.a. por acre al año.
- Se puede utilizar un coadyuvante con **Sivora SPC**.
- **Intervalo de acceso restringido (REI):** 12 horas.
- **Intervalo de precosecha (PHI): NO** lo aplique durante los 7 días previos a la cosecha.

## FRUTAS POMÁCEAS

Manzano, manzano silvestre, níspero japonés, majuelo (espino blanco), peral, peral oriental y membrillo

Enfermedades	Concentración de producto (Fl oz/acre)	Instrucciones de aplicación	Intervalo de aplicación (Días)
Mildiú (moho) polvoroso <i>(Podosphaera leucotricha)</i> Roya del membrillo <i>(Gymnosporangium clavipes)</i> Roya del manzano-cedro <i>(Gymnosporangium juniperi-virginianae)</i> Mancha de la fruta de Brooks <i>(Mycosphaerella pomi)</i>	8 - 12 (0.065 - 0.098 lb de i.a.)	Comience las aplicaciones en la etapa de puntas verdes y continúe durante los rociados de cobertura.	10
Costra del manzano <i>(Venturia inaequalis)</i> Mancha de hollín <i>(Gloeodes pomigena)</i> Podredumbre por <i>Botryosphaeria</i> o podredumbre blanca <i>(Botryosphaeria dothidea)</i> Podredumbre negra <i>(Botryosphaeria obtusa)</i> Podredumbre amarga <i>(Colletotrichum gloeosporioides, C. acutatum)</i> Mancha foliar por Alternaria <i>(Alternaria mali)</i>	13 (0.106 lb de i.a.)	Comience las aplicaciones cuando se presentan las puntas verdes o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la costra primaria. Continúe las aplicaciones durante todo el período de la costra primaria.  Mezcle <b>Sivora SPC</b> con un protector, por ejemplo mancozeb, para el control de la costra (sarna).  Las aplicaciones de mezcla en tanque que contengan <b>Sivora SPC</b> con un protector (como mancozeb) también ayudarán a controlar eficazmente las podredumbres de verano especificadas cuando la aplicación se realice al momento del rociado de cobertura.	7 - 10
Costra del peral <i>(Venturia pirina)</i>		Comience la aplicación en la etapa de botones rosa y continúe durante todo el período de la costra primaria.  Mezcle <b>Sivora SPC</b> con un protector, por ejemplo mancozeb, para lograr un mejor control de la costra.	

**Restricciones:**

- Ninguna aplicación individual puede exceder 13 fl oz (0.106 lb de i.a.) de producto por acre.
- **Intervalo mínimo entre aplicaciones (RTI):** 7 días.
- **NO** haga más de 4 aplicaciones por año.
- **NO** aplique más de 52 fl oz (0.423 lb de i.a.) de producto por acre al año.
- **NO** aplique más de 0.423 lb de i.a. por acre al año.
- **Intervalo de acceso restringido (REI):** 12 horas.
- **Intervalo de precosecha (PHI):** **NO** lo aplique durante los 14 días previos a la cosecha.

## FRUTAS CON HUESO

Albaricoque (damasco), nectarina, cereza dulce, cereza ácida, melocotón (durazno), ciruela, ciruela chickasaw, ciruela silvestre Damson, ciruela japonesa, ciruela plumcot (ciruela-damasco), ciruela pasa (ciruela para deshidratar).

Enfermedades	Concentración de producto (Fl oz/acre)	Instrucciones de aplicación	Intervalo de aplicación (Días)
Mildiú (moho) polvoroso <i>(Podosphaera clandestina)</i>	14 (0.114 lb de i.a.)	Comience las aplicaciones a partir de la caída de los pétalos. Repita según sea necesario si las condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad.	7
Podredumbre color café Tizón de la floración <i>(Monilinia fructicola)</i>	14 (0.114 lb de i.a.)	Comience las aplicaciones cuando haya de 1% a 5% de floración, seguida de una aplicación cuando haya de 50% a 100% de floración.	7
Podredumbre color café en la fruta <i>(Monilinia fructicola)</i>	14 (0.114 lb de i.a.)	Aplique entre una y dos semanas antes de la cosecha.	7
Mancha de la hoja del cerezo <i>(Blumeriella jaapii)</i>	14 (0.114 lb de i.a.)	Comience las aplicaciones a partir de la caída de los pétalos. Repita según sea necesario si las condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad. En zonas donde se conozca que haya resistencia a los triazoles, aplique <b>Sivora SPC</b> con un fungicida protector para lograr un control eficaz.	7

**Restricciones:**

- Ninguna aplicación individual puede exceder 14 fl oz (0.114 lb de i.a.) de producto por acre.
- **Intervalo mínimo entre aplicaciones (RTI):** 7 días.
- **NO** haga más de 4 aplicaciones por año.
- **NO** aplique más de 56 fl oz (0.455 lb de i.a.) de producto por acre al año.
- **NO** aplique más de 0.455 lb de i.a. por acre al año.
- **Intervalo de acceso restringido (REI):** 12 horas.
- **Intervalo de precosecha (PHI):** **NO** lo aplique durante los 7 días previos a la cosecha.

## ALMACENAMIENTO Y DESECHO

**NO** contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacene el producto en un recipiente herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco. Almacene el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un lugar cerrado bajo llave.

**DESECHO DE PESTICIDAS:** La mezcla de aplicación del pesticida o el agua resultante del enjuague del equipo que no se pueda usar debe desecharse en un área para desechos sanitarios aprobada para pesticidas. La eliminación inadecuada de pesticida sobrante, mezclas de aplicación o aguas de enjuague o lavado de envases constituye una violación de la Ley Federal (EE. UU.). Si estos residuos no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, contacte a la agencia para el manejo de pesticidas o control ambiental de su estado, o al representante para el Manejo de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener indicaciones del proceso a seguir para su eliminación.

### MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES:

**Para recipientes de plástico de ≤ 5 galones (19 L): Recipiente no rellenable:** **NO** reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces (o equivalente) el recipiente inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Llene el recipiente 1/4 con agua y tape de nuevo. Agite por 10 segundos. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca para el reciclaje, si está disponible, o perfore y deseche en un área adecuada para desechos sanitarios o por otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

**Para recipientes de plástico de > 5 galones (19 L): Recipiente no rellenable:** **NO** reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces (o equivalente) el recipiente inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones: Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar. Llene el recipiente 1/4 con agua. Tape de nuevo y asegure los cierres. Vuelque el recipiente al lado y hágalo rodar por 30 segundos, asegurando por lo menos una revolución completa. Ponga el recipiente vertical e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Dé vuelta al recipiente hacia el lado opuesto e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca para el reciclaje, si está disponible, o perfore y deseche en un área adecuada para desechos sanitarios o por otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

## LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

**IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR.** Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador aceptan la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Podrían ocurrir ineficacia, daños y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores como la forma de uso o aplicación (incluido el uso indebido), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, todo lo cual está fuera del control de ATTICUS, LLC. En la medida que lo permita la ley pertinente, el usuario o el comprador asumirán todos esos riesgos.

**EXENCIÓN DE GARANTÍAS:** En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, aparte de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida que lo permita la ley pertinente, ATTICUS, LLC, el fabricante y el vendedor no serán responsables de daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso, el manejo, la aplicación, el almacenamiento o la eliminación de este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, el manejo, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

Sivora™ es una marca comercial de Atticus, LLC.

TopGuard® es una marca comercial registrada de The FMC Corporation o una empresa afiliada.

20250707ap1